

INTERNE GENEESKUNDE

ECHO-ENDOSCOPIE VAN DE SLOKDARM EN MAAG

Afspraak

Dag en datum: dag

Tijd: uur

Mocht de datum u niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Waar: u wordt verzocht u te melden bij de Infobalie, centrale hal.

In principe wordt u geholpen op de aangegeven tijd. Omdat spoedgevallen echter voorgegaan en het niet altijd te voorspellen is hoe lang een onderzoek duurt, kan het zijn dat u niet precies op de afgesproken tijd geholpen wordt.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wat is een echo-endoscopie?

Uw behandelend arts heeft een echo-endoscopie van de slokdarm en maag voorgesteld. Bij dit onderzoek bekijkt en beoordeelt de arts:

- de maagwand
- de omliggende organen, bijvoorbeeld de alvleesklier
- de lymfeklieren
- de bloedvaten

Het onderzoek gebeurt met een echo-endoscoop. Dit is een soepele slang van ongeveer één centimeter doorsnee. In de slang zit een minicamera en een echoap-



paraatje. Met behulp van geluidsgolven maakt dit apparaat beelden. Eventueel neemt de arts tijdens het onderzoek vocht of kleine stukjes weefsel weg. Dit is meestal pijnloos.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u die vóór het onderzoek stellen. U kunt ook contact opnemen met uw behandelend arts.

Hoe bereidt u zich voor?

Vragenlijstje

Op de laatste bladzijde vindt u een aantal vragen die voor het onderzoek van belang kunnen zijn. Wilt u deze vragen thuis alvast beantwoorden?

Kleding

Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen. Gebruik voor het onderzoek geen lippenstift.

Nuchter

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom mag u op de dag van het onderzoek vanaf 24 uur 's nachts niets meer eten. Water en thee drinken mag tot drie uur voor het onderzoek.

Vindt het onderzoek 's middags plaats, dan mag u nog een ontbijt gebruiken vóór 09.00 uur. Water en thee drinken mag tot drie uur voor het onderzoek.

Diabetes

Als u diabetespatiënt bent, dan moet u speciale maatregelen treffen. Vraag naar de speciale voorbereidingsfolder voor diabetespatiënten of neem contact op met de diabetesverpleegkundige.

Medicijnen

Heeft u een stoornis van de bloedstolling? Of gebruikt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden zoals Acenocoumarol (Sintrom) en Fenprocoumon (Marcoumar)? Dan moeten deze in overleg met uw arts gestopt worden. De Trombosedienst zorgt er voor dat de stolling van uw bloed goed is op de dag van het onderzoek.

Bloedverdunnende middelen zoals aspirine, Ascal, Acetylsalicylzuur en Carbasalaatcalcium kunt u bij dit onderzoek gewoon doorgebruiken.

Echter bij gebruik van Ascal en Plavix samen, moet u de Plavix 5 dagen voor het onderzoek stoppen: dit altijd in overleg met arts die dit medicijn heeft voorgeschreven.

Wat neemt u mee?

- Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart);
- Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis.
- Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek print dit AMO gratis voor u uit.
- Heeft u een brief gekregen van de huisarts? Neemt u deze dan ook mee.
- De ingevulde vragenlijst op de laatste bladzijde van deze folder.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij dit onderzoek wordt u voor één dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Het onderzoek zelf vindt plaats op de afdeling Endoscopie.

Op de afdeling Dagbehandeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige en zij wijst u uw bed. Zij doet nog enkele controles bij u en brengt een infuusnaaldje in. Daarna brengt zij u naar de afdeling Endoscopie waar het onderzoek plaatsvindt .

- U krijgt een spray om uw keel te verdoven. Dit maakt het inbrengen van de endoscoop makkelijker. U heeft dan minder last van kokhalsneigingen.
- U krijgt een knijpertje op uw vingertop. Hiermee meten we uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
- U doet eventuele losse gebitsdelen uit en uw bril zet u af.
- Via een infuusnaaldje in de arm krijgt u een slaapmiddel (midazolam) toegediend. Dit roesje is een hulpmiddel voor u om het onderzoek gemakkelijker te ondergaan. Sommige mensen vallen hiervan in slaap. Anderen blijven wakker, maar zijn meer ontspannen.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel. De verpleegkundige plaatst een ring tussen uw tanden. Dit is om uw gebit en de endoscoop te beschermen. De arts brengt de scoop in uw keel. U houdt voldoende ruimte in uw keelholte over om normaal te kunnen ademen.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek gaat u weer met bed terug naar de afdeling Dagbehandeling. Hier blijft u ongeveer anderhalf uur om uit te slapen.

Mogelijke problemen

Een echo-endoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Er treden bijna nooit problemen op.

- Bij het gebruik van een slaapmiddel of pijnstilling treden er heel soms ademhalingsproblemen en hartfunctiestoornissen op.
- Bij het wegnemen van vocht of weefsel uit de alveesklier is er een kleine kans op het ontstaan van een alveesklierontsteking, infectie of voorbijgaande buikpijn. Om dit te voorkomen, krijgt u soms vooraf antibiotica toegediend.

Na het onderzoek

Na verdoving met een kalmeringsmiddel mag u op de dag van het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U mag ook niet alleen naar huis gaan. Zorgt u er daarom voor dat iemand u komt ophalen. U kunt deze dag beter geen belangrijke beslissingen nemen, omdat u nog onder invloed van het kalmeringsmiddel kunt zijn.

Keelklachten

Als uw keel verdoofd is, kunt u zich sneller verslikken dan anders. Wacht u daarom een uur voor u iets gaat eten of drinken. Begin voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, kunt u verder gewoon eten en drinken. Na het onderzoek is uw keel waarschijnlijk wat gevoelig, zeker als u tijdens het onderzoek enige malen flink heeft moeten boeren. Dit gevoel gaat vrij snel weer weg.

Antistollingsmedicijnen

Gebruikt u antistollingsmedicijnen die in verband met het onderzoek gestopt zijn? Overlegt u dan met uw arts of de trombosedienst wanneer u deze weer moet gebruiken.

Klachten thuis

Krijgt u in de dagen na het onderzoek thuis klachten zoals hevige buikpijn of koorts? Neemt u dan meteen contact op met het ziekenhuis:

- Tijdens kantooruren: afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51, kies dan optie 1, het secretariaat.
- Buiten kantooruren: afdeling Spoedeisende Hulp (073) 553 27 00.

De uitslag

Uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u. Als er een stukje weefsel is weggenomen, wordt dit verder onderzocht in het laboratorium. De uitslag daarvan hoort u ook van uw behandelend arts. Deze bespreekt ook de eventuele behandelingsmogelijkheden met u.

Vragenlijst: uw medische conditie

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden en aankruisen wat voor u van toepassing is?

Heeft u een stoornis van de bloedstolling?

- Ja
 Nee

Als u één of meerdere van onderstaande vragen met ja beantwoordt en u dit nog niet besproken heeft, neemt u dan een week vóór het onderzoek contact op met uw eigen arts.

Bent u momenteel onder behandeling van de Trombosedienst?

- Ja
 Nee

Gebruikt u acenocoumarol of fenprocoumon?

- Ja
 Nee

Heeft u een pacemaker?

- Ja
 Nee

Heeft u een I.C.D. (implanteerbare defibrillator)?

- Ja
 Nee

Naam:

Geboortedatum: