

Endoscopische ultrasonografie

U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten een endoscopische ultrasonografie (EUS) van uw slokdarm, maag, alvleesklier of endeldarm te laten maken. Dit onderzoek met de endo-echoscoop geeft meer informatie over de wand van het maag-darmkanaal en de omliggende organen. In deze folder geven wij u informatie over het onderzoek.

Endoscopische ultrasonografie

Een endoscopie is een onderzoek met een endoscoop. Dit is een dunne, buigzame en bestuurbare slang. De arts schuift de slang via de mond of anus in het lichaam. Hij kan via de mond het slijmvlies aan de binnenkant van de slokdarm, maag en een stukje van de dunne darm nakijken. De dikke darm bekijkt hij via de anus. Bij een endoscopische ultrasonografie gebruikt de arts een endoscoop met aan het uiteinde een klein echo-apparaatje. Dit echo-apparaatje zendt geluidsgolven uit. De geluidsgolven dringen in de weefsels. Hierdoor kan de arts informatie verkrijgen over de wand van het maag-darmkanaal en de dieper gelegen organen. Soms neemt de arts met een dunne naald weefselmonsters (biopsie) af.

Belangrijk

- Let goed op de voorbereidingen! Het onderzoek kan alleen doorgaan als u deze voorbereidingen volgt.
- Meld bij het maken van een afspraak of u diabetespatiënt bent.
- Als de trombosedienst u bloedverdünnende medicijnen voorschrijft zoals Marcoumar of Sintrommitis, stolt uw bloed minder snel bij een verwonding. Als de kans bestaat dat een stukje weefsel wordt weggenomen (punctie), moet u tijdelijk stoppen met deze medicijnen, in overleg met de trombosedienst. Andere middelen die de bloedstolling kunnen beïnvloeden zoals bijvoorbeeld Ascal, Ibuprofen, Diclofenac of Voltaren mag u meestal blijven gebruiken. Laat wel graag aan ons weten dat u deze medicijnen gebruikt. Stop nooit op eigen initiatief met medicijnen.
- Heeft u diabetes en gebruikt u 's ochtends medicijnen? Vraag dan aan uw verwijzend arts hoe u het medicijngebruik kunt aanpassen.
- Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, meld dit dan aan de arts. Er is meestal geen bezwaar tegen het ondergaan van het onderzoek.
- Het is heel belangrijk dat u het onderzoek rustig en ontspannen ondergaat. Daarom krijgt u een slaapmiddel. Hierdoor bent u na het onderzoek suf en slaperig. Zorg daarom dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis of dat we iemand kunnen bellen om u na het onderzoek naar huis te brengen. Als u geen begeleiding heeft, kan het onderzoek niet doorgaan. Meer informatie hierover leest u in de folder 'Onderzoek terwijl u licht slaapt'. U kunt deze krijgen op de Endoscopie- en Behandelafdeling.

Uw afspraak

In verband met de voorbereiding van het onderzoek verzoeken wij u vriendelijk om tenminste vijftien minuten voor tijd aanwezig te zijn. Bent u verhinderd, neem dan tenminste 24 uur van tevoren telefonisch contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling, via 020 599 29 09.

Neem bij ieder bezoek mee:

- De aanvraagbrief, verwijsbrief of cd-rom van uw verwijzend specialist.
- Een legitimatiebewijs, zoals bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort.
- Uw actueel medicijnoverzicht (gratis verkrijgbaar via uw apotheek).

Waar meldt u zich?

Het onderzoek vindt plaats op locatie Oosterpark. Loop vanaf de hoofdingang voorbij het eerste polikliniekplein P1. Neem links de lift of rechts de trap naar de eerste verdieping. Volg dan de borden 'Endoscopie- en Behandelafdeling'. Daar meldt u zich bij de balie.

Het onderzoek

Vorbereiding thuis

Onderzoek via de mond

Het onderzoek kunnen we alleen doen als uw slokdarm en maag leeg zijn.

- Is uw onderzoek voor 12 uur: u mag vanaf 24.00 uur 's nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken. Als u 's morgens medicijnen moet gebruiken, overleg dan met uw verwijzend arts of u het innemen van medicijnen moet aanpassen. Dit geldt ook voor diabetespatiënten die insuline spuiten of patiënten die medicijnen gebruiken en daarbij 's morgens moeten eten.
- Is uw onderzoek na 12 uur: u mag tot zes uren voor het onderzoek een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld een kopje thee met een beschuitje. Daarna mag u niets meer eten en drinken. Eventuele medicijnen kunt u 's morgens innemen met een slokje water.

Onderzoek via de anus

- Het onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als de hele dikke darm schoon is. Dit gebeurt met het middel Moviprep. Meer informatie hierover vindt u in het inlegvel. Het is belangrijk dat u zich goed aan de voorschriften houdt. Als u zwanger bent kunt u het laxermiddel Moviprep zonder bezwaar gebruiken.
- Neem schone onderkleding mee. U kunt zich dan na het onderzoek verschonen als dat nodig is.

Belangrijk bij Moviprep:

- Houdt u zich aan de instructies van onze gebruiksaanwijzing (en niet die van de apotheek).
- Eet vanaf 2 dagen voor het onderzoek GEEN producten met zaden of pitten, zoals grof volkorenbrood, tomaat, kiwi.

Het onderzoek

- Bij een onderzoek via de maag kunnen we door schuim de binnenkant van uw maag niet goed zien. Daarom krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat. We vragen u eventuele losse gebitsdelen uit te doen. We verdoven met een spray uw keel om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. U gaat op uw linkerzijde op het bed liggen. We plaatsen een 'knijpertje' op één van uw vingers of op uw oor. Hiermee controleren wij tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. De verpleegkundige plaatst een ring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de endoscoop. De arts brengt de endo-echoscoop via de mond naar binnen en voert deze door naar de slokdarm, maag of begin van de dunne darm (twaalfvingerige darm).
- Als u een endo-echoscopie van de endeldarm krijgt, brengt de arts gelei aan rond het gebied van de anus en de endoscoop aan. Daarna brengt de arts de endoscoop via de anus naar binnen.
- Om de geluidsgolven beter te laten geleiden brengen we soms door de endoscoop water in. Soms moeten we van endoscoop wisselen.

Na het onderzoek

- Na afloop brengen we u naar de herstel kamer. U kunt hier rustig herstellen van het onderzoek.
- Wanneer uw endeldarm is onderzocht, adviseren wij u om na het onderzoek naar het toilet te gaan. U kunt dan het water kwijtraken dat tijdens het onderzoek is ingebracht en eventueel in de darm is achtergebleven.
- Meestal kunt u na een uur weer naar huis.

Doet het onderzoek pijn?

Het inbrengen van de endoscoop kan een vervelende ervaring zijn. Door het slaapmiddel merken de meeste mensen er echter weinig van.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt twee tot drie kwartier. Wanneer een extra handeling wordt verricht, zoals bijvoorbeeld een punctie, duurt het onderzoek iets langer.

De uitslag

Voordat u naar huis gaat spreekt de arts of verpleegkundige met u en vertelt kort of het onderzoek goed is verlopen. Soms krijgt u van de arts een voorlopige uitslag. Uw behandelend of verwijzend arts krijgt een uitgebreid verslag. Het onderzoek van weggenomen weefsel duurt zeven tot tien dagen. De uitslag hiervan bespreekt uw eigen specialist met u.

Complicaties

Een endo-echoscopie is een veilige onderzoeksmethode. Toch kunnen complicaties optreden.

- Het gebruik van slaapmiddelen gaat gepaard met een klein risico. Om dit risico te beperken controleren wij zorgvuldig uw ademhaling en polsfrequentie tijdens het onderzoek en daarna.

- Een luchtweginfectie of een longontsteking kan het gevolg zijn van het zich verslikken in de maaginhoud. Dit kan gebeuren bij mensen die een slaapmiddel krijgen voor het onderzoek.
- Zeer zelden ontstaat een scheurtje in de slokdarm, de maag of de dunne darm. Als we wat weefsel wegnemen door een punctie bestaat een zeer kleine kans op een nabloeding.
- Bij het wegnemen van weefsel of vocht uit de alveesklier is er een klein risico (minder dan een tot twee procent) op het ontstaan van een alveesklierontsteking, infectie of voorbijgaande buikpijn.
- Als u heftige buikpijn of koorts krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
 Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):

- www.olvg.nl/mdl

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 599 29 09 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

Oost
 Oosterpark 9
 1091 AC Amsterdam

West
 Jan Tooropstraat 164
 1061 AE Amsterdam

Spuistraat
 Spuistraat 239 A
 1012 VP Amsterdam

IJburg
 IJburglaan 727
 1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene-voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 10 mei 2017, 0485