

# Endoscopische echografie

## van de slokdarm en de organen in de bovenbuik

**Een endoscopische echografie is een onderzoek voor beeldvorming van slokdarm, maag en de omliggende organen in de borstholte en bovenbuik. Met dit onderzoek kunnen veranderingen in het weefsel worden gekarakteriseerd.**

Het instrument, een zogenoemde endo-echoscoop, wordt via de mond in de slokdarm gebracht. Deze scoop kan geluidsgolven uitzenden. De geluidsgolven worden teruggekaatst en het omringende weefsel wordt zo weergegeven op een beeldscherm. Het onderzoek duurt tussen de dertig en vijfenveertig minuten.

### **Vorbereiding**

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag niets meer eten of drinken vanaf 0.00 uur.

De behandeling vindt plaats onder sedatie, dat wil zeggen dat u een slaapmiddel krijgt toegediend waardoor u weinig van het onderzoek zult merken. Meer informatie over sedatie kunt u vinden in de brochure *Sedatie*.

In sommige gevallen wordt tijdens het onderzoek een stukje weefsel of cellen weggenomen voor onderzoek in het laboratorium. Wanneer tijdens dit onderzoek een punctie verricht gaat worden dient u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals Sintrommitis® (=acencoumarol), Marcoumar® (=fenprocoumon) of Ascal® (acetylsalicylzuur) te staken.

Dit dient wel te worden overlegd met de arts die deze medicijnen aan u heeft voorgeschreven. In het algemeen dienen deze medicijnen een week voor de behandeling te worden gestaakt wegens verhoogde kans op nabloedingen. Zonodig kan uw voorschrijvend arts contact opnemen met onze afdeling.

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een infuusnaaldje ingebracht voor toediening van het slaapmiddel (de sedatie).

### **Het onderzoek**

- Wanneer u een gebitsprothese draagt doet u deze gedurende het onderzoek uit, als u een bril draagt zet u deze af.
- Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij.
- U krijgt een bijtring tussen de tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen.
- Het slaapmiddel wordt toegediend.
- De endoscoop wordt ingebracht en de arts beoordeeldt het verkregen beeld.
- Soms is het noodzakelijk dat weefsel wordt afgenomen voor onderzoek. Dit is pijnloos.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u een slaapmiddel heeft gekregen, blijft u minstens een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Na het onderzoek mag u onder begeleiding naar huis. U kunt de rest van de dag nog wat slaperig zijn. U mag die dag niet zelf autorijden.

### **Complicaties**

Dit onderzoek is een veilig onderzoek. Slechts in zeer zeldzame gevallen ontstaan bij dit onderzoek complicaties. Deze kunnen zijn: een bloeding of een scheurtje in maag of slokdarm. Een opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om dit goed te behandelen.

**Vragen**

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de poliklinische zorgeenheid maag-, darm- en leverziekten  
receptie Q  
telefoon (020) 444 1125.